

Universidade Federal Fluminense - GMA  
VE1 - Cálculo 2B - Turma E1 - Prof. Zhou Cong

Nome Completo: \_\_\_\_\_ Data: 16 de Maio de 2019

**Questão 1** (20 pts). Escolha apenas **uma** dentre as três opções a seguir para ser o formato do conjunto  $C$ : a folha superior da hiperbolóide de duas folhas, Cone e hemisfério inferior da esfera. Defina três funções  $F$ ,  $G$  e  $H$  tais que:

$$C = \text{Gr}(F) = C_0(G) = \text{Im}(H),$$

explícite a **expressão**, o **domínio** e o **contradomínio** dessas funções.

**Observação:**  $\text{Gr}(F)$  é o gráfico da função  $F$ ,  $C_0(G)$  é o conjunto de nível 0 da função  $G$  e  $\text{Im}(H)$  é a imagem da função  $H$ . Queremos definir essas três funções de modo que o conjunto  $C$  escolhido seja igual ao gráfico de  $F$ , conjunto de nível 0 de  $G$  e imagem de  $H$  simultaneamente.

**Questão 2** (20 pts). Considere as funções  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  e  $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  com:

$$G(x, y) = (x^2 + y - 1, x + y).$$

Além disso,  $F(1, 0) = F(0, 1) = 3$ ,  $\nabla F(1, 0) = (-1, -1)$  e  $\nabla F(0, 1) = (2, 2)$ . Seja  $H(x, y) = (F \circ G)(x, y)$ .

- (a) (10 pts) Encontre o gradiente  $\nabla H(1, 0)$ .
- (b) (10 pts) Suponha que  $F$  é diferenciável, encontre a equação do plano tangente ao gráfico da função  $H$  no ponto  $(1, 0, 3)$ .

**Questão 3** (20 pts). Responda os itens abaixo justificando a sua resposta:

- (a) (10 pts) Considere a curva  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4$  dada por  $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t, -t)$ , escolha um ponto que pertence à imagem desta curva e escreva uma parametrização da reta tangente à curva no ponto escolhido.
- (b) (10 pts) Encontre um valor  $k \in \mathbb{R}$  para que a expressão abaixo  $f$  seja uma função diferenciável no ponto  $(0, 0)$ , e mostre que para o valor encontrado da função é diferenciável em todo ponto:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^k y^3}{x^2 + y^6}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

**Questão 4** (40 pts). Considere a função  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida pela expressão:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(x - y)}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}, & x \geq y \text{ e } (x, y) \neq (0, 0), \\ \frac{\cos(x - y) - 1}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}, & x < y, \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) (15 pts) Mostre que a função  $f$  é contínua no ponto  $(0, 0)$ .
- (b) (15 pts) Usando a definição, calcule, caso existir, as derivadas parciais da função  $f$  no ponto  $(0, 0)$ .
- (c) (10 pts) A função  $f$  é diferenciável no ponto  $(0, 0)$ ? Justifique a resposta demonstrando a diferenciabilidade ou o contrário.

**Dica:** Esta função está definida com fórmulas diferentes nos seguintes três conjuntos:

$$C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq y \text{ e } (x, y) \neq 0\}, \quad C_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x < y\} \quad \text{e} \quad C_3 = \{(0, 0)\}.$$

Esboce esses conjuntos, note que o ponto  $(0, 0)$  é um ponto de acumulação dos conjuntos  $C_1$  e  $C_2$ . Então para verificar a continuidade e existência e o valor das derivadas parciais de  $f$  é preciso fazer duas contas: a primeira para a fórmula da função  $f$  no conjunto  $C_1$  e a segunda para a fórmula da função  $f$  no  $C_2$ .

No item (b), ao verificar a existência e para encontrar o valor das derivadas parciais você provavelmente vai precisar usar limites laterais ( $\lim_{t \rightarrow 0^-}$  e  $\lim_{t \rightarrow 0^+}$ ). Ao fazer as contas, encontrará dentro desses limites uma expressão contendo algum termo da forma  $\sqrt{t^2} = |t|$ , lembre-se em usar a definição da norma, que é:  $|t| = -t$  se  $t < 0$  e  $|t| = t$  se  $t \geq 0$ .